

# Desinfektionsplan

Gemäß der BGR/TGR 250

	Was	Womit	Wie	Wann	Wer	
HAUT & HÄNDE			<b>Händewaschung</b> FAVORIT Waschlotion sensitive	Bei sichtbarer Verschmutzung. Hände gründlich mit Waschlotion und Wasser waschen, abspülen und mit Einmalhandtüchern trocknen. Gemeinschaftshandtücher dürfen nicht verwendet werden. Entnahme des Waschpräparates aus Direktspender.	Bei Bedarf 500 ml oder 1 L Kartuschen verwenden, diese nach Gebrauch entsorgen. Ist dieses so nicht möglich, muss der Spender bei Wiederauffüllung immer vorher desinfiziert werden.	Alle Mitarbeiter
HAUT & HÄNDE			<b>Hygienische Händedesinfektion</b> FAVORIT Händedesinfektion Plus	Vor und nach Benutzung von Schutzhandschuhen. Bei Arbeitsvor- und Nachbereitung. <b>Hygienische Händedesinfektion</b> werden die Hände mit 3 ml der Lösung eingerieben und entsprechend den Einwirkzeiten feucht gehalten. Insbesondere sind Fingerkuppen und Nagelfalze zu beachten.	Vor und nach jeder Behandlung eines Patienten, inkl. Behandlungsunterbrechung. <b>500 ml oder 1 L Kartuschen verwenden</b> , diese nach Gebrauch entsorgen. Ist dieses so nicht möglich, muss der Spender bei Wiederauffüllung immer vorher desinfiziert werden.	Alle Mitarbeiter
HAUTDESINFektion			<b>Hautdesinfektion</b> Hautantisepticum	Desinfektionsmittel direkt auf die Haut aufsprühen, mit Tupfer wischen.	Vor Blutentnahme und Injektion	Pflegepersonal Ärzte
INSTRUMENTE			<b>Instrumente, Fieberthermometer, Nagelschere</b> FAVORIT Wet Wipes* FAVORIT Hygienetücher FAVORIT Easy Wipes* mit FAVORIT Sprüh- und Wischdesinfektion PLUS	Instrumente sofort in die Lösung legen, danach mit Wasser abspülen und steril verpacken. <b>Herstellerrangaben beachten!</b>	Nach Gebrauch	Pflegepersonal
LIEGEN/GERÄTE			<b>Medizinische Geräte, Blutdruckmanschetten</b> FAVORIT Wet Wipes* FAVORIT Hygienetücher FAVORIT Easy Wipes* mit FAVORIT Sprüh- und Wischdesinfektion PLUS	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen. Flächen vollständig benetzen. Nach Ablauf der Einwirkzeit ggf. mit Einmaltuch nachwischen. <b>Herstellerrangaben beachten!</b>	Nach Gebrauch/Benutzung	Pflegepersonal
KLEINE FLÄCHEN			<b>Oberflächen: Arbeitsflächen, Türgriffe u. ä.</b> FAVORIT Wet Wipes* FAVORIT Hygienetücher FAVORIT Easy Wipes* mit FAVORIT Sprüh- und Wischdesinfektion PLUS	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen. Flächen vollständig benetzen. Nach Ablauf der Einwirkzeit ggf. mit Einmaltuch nachwischen. Zusätzlich 1 x wöchentlich feucht abwischen.	1 mal täglich reinigen Bei Kontamination Bei Bedarf	Reinigungspersonal
FUSSBÖDEN			<b>Fußböden, Badewannen, Waschbecken</b> FAVORIT Flächendesinfektion	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode, z.B. Bezugs-Wechsel-Methode. Nicht nachtrocknen. Zusätzlich 1 x wöchentlich feucht abwischen.	Nach Benutzung Bei Kontamination Täglich, bei Bedarf	Pflegepersonal
KLEINE FLÄCHEN			<b>Steckbecken, Fäkalspüle</b> FAVORIT Flächendesinfektion	Steckbeckenautomat	Nach Gebrauch	Pflegepersonal
ABFALLEIMER			<b>Abfalleimer</b> FAVORIT Flächendesinfektion	Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen. Spitze, scharfe und zerbrechliche Gegenstände dürfen nur sicher umschlossen in den Abfall gegeben werden. Abfallschlüssel und Verordnungen der Länder sind einzuhalten. <b>Abfälle in gut schließenden Behältnissen sammeln und mindestens einmal täglich entsorgen.</b>	Wöchentlich, bei Bedarf	Reinigungspersonal
WÄSCHE			<b>Allgemeine Wäsche</b> Vollwaschmittel	Sammeln und verschließen.	3 mal wöchentlich bei Bedarf sofort	Wäscherei
WÄSCHE			<b>Infektiöse Wäsche</b> FAVORIT Flächendesinfektionher	Sammeln und verschließen, desinfizieren durch Einweichen, anschließend waschen, alternativ desinfizierend waschen.	Sofort	Wäscherei
INFEKTIONEN			<b>Meldepflichtige Infektionen</b> Siehe RKI-Liste	Desinfektion nach RKI- Richtlinie	Bei meldepflichtigen Krankheiten	Desinfektor/Gesundheitsamt

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. **Vor Gebrauch stets Etikett und Gebrauchsinformationen lesen.** Bei Desinfektionsmaßnahmen sind Konzentration und Einwirkzeit zu beachten. Bei Umgang mit Desinfektionsmitteln, die nicht für die Anwendung am menschlichen Körper vorgesehen sind, sind Schutzhandschuhe zu tragen. Eine Risikobewertung und Einstufung der aufzubereitenden Medizinprodukte ist durchzuführen. Die Berufsgenossenschaftliche Regel BGR 250 und die Empfehlung des RKI sind zu berücksichtigen. Dieser Desinfektionsplan ist auf Basis der BGR 250 erstellt. Die Überprüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit liegt beim Anwender.

# Desinfektionsplan

Gemäß der BGR/TGR 250

Was	Womit	Wie	Wann	Wer
HAUT & HÄNDE			Bei Bedarf 500 ml oder 1 L Kartuschen verwenden, diese nach Gebrauch entsorgen. Ist dieses so nicht möglich, muss der Spender bei Wiederauffüllung immer vorher desinfiziert werden.	
HAUT & HÄNDE			Vor und nach jeder Behandlung eines Patienten, inkl. Behandlungsunterbrechung. <b>500 ml oder 1 L Kartuschen verwenden</b> , diese nach Gebrauch entsorgen. Ist dieses so nicht möglich, muss der Spender bei Wiederauffüllung immer vorher desinfiziert werden.	
HAUTDESINFEKTION			Vor Blutentnahme und Injektion	
INSTRUMENTE			Nach Gebrauch	
LIEGEN/GERÄTE			Nach Gebrauch/Benutzung	
KLEINE FLÄCHEN			1 mal täglich reinigen Bei Kontamination Bei Bedarf	
FUSSBÖDEN			Nach Benutzung Bei Kontamination Täglich, bei Bedarf	
KLEINE FLÄCHEN			Nach Gebrauch	
ABFALLEIMER		Desinfizierende Feucht-Wisch-Methode. Nicht nachtrocknen. Spitze, scharfe und zerbrechliche Gegenstände dürfen nur sicher umschlossen in den Abfall gegeben werden. Abfallschlüssel und Verordnungen der Länder sind einzuhalten. <b>Abfälle in gut schließenden Behältnissen sammeln und mindestens einmal täglich entsorgen.</b>	Wöchentlich, bei Bedarf	
WÄSCHE			3 mal wöchentlich bei Bedarf sofort	
WÄSCHE			Sofort	
INFEKTIONEN		Desinfektion nach RKI- Richtlinie	Bei meldepflichtigen Krankheiten	Desinfektor/Gesundheitsamt

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. **Vor Gebrauch stets Etikett und Gebrauchsinformationen lesen.** Bei Desinfektionsmaßnahmen sind Konzentration und Einwirkzeit zu beachten. Bei Umgang mit Desinfektionsmitteln, die nicht für die Anwendung am menschlichen Körper vorgesehen sind, sind Schutzhandschuhe zu tragen. Eine Risikobewertung und Einstufung der aufzubereitenden Medizinprodukte ist durchzuführen. Die Berufsgenossenschaftliche Regel BGR 250 und die Empfehlung des RKI sind zu berücksichtigen. Dieser Desinfektionsplan ist auf Basis der BGR 250 erstellt. Die Überprüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit liegt beim Anwender.